

VAIOLO DELLE SCIMMIE (MONKEYPOX-MPX)



COSA È IMPORTANTE SAPERE

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

UOC MTS

ATS DI MILANO

Sistema Socio Sanitario



ATS Milano
Città Metropolitana

TRASMISSIONE



Si trasmette con contatto stretto con una persona infetta tramite:

- + goccioline respiratorie (droplets) durante il contatto diretto e prolungato faccia a faccia
 - + materiale infetto proveniente dalle lesioni cutanee,
 - + fluidi corporei di una persona infetta
 - + contatto della mucosa o della pelle non integra con le lesioni cutanee aperte
 - + superfici o oggetti contaminati dal virus, come lenzuola, indumenti, vestiti, utensili, ecc.
- Particolare fattore di rischio è l'attività sessuale con partner multipli

SINTOMI

- La malattia da virus del vaiolo delle scimmie è in genere una malattia lieve ma può aggravarsi soprattutto in alcuni gruppi di popolazione particolarmente fragili quali bambini, donne in gravidanza e persone immunocompromesse.
- Il periodo di incubazione è solitamente compreso tra 6 e 13 giorni, ma può variare da 5 a 21 giorni.
- Può causare sintomi simil-influenzali: febbre, dolori muscolari, stanchezza, ingrossamento dei linfonodi, mal di schiena, cefalea. Caratteristica è la comparsa di eruzione cutanea che evolve in papule, vescicole, pustole e infine croste, in varie parti del corpo, compresa la zona inguinale e genitale. Possono essere presenti anche lesioni sulla mucosa orale o oftalmica.
- I sintomi si risolvono spontaneamente entro 2-4 settimane.

CONTAGIOSITÀ

La comparsa dell'eruzione cutanea è considerato l'inizio del periodo contagioso che termina con la caduta delle croste; tuttavia, si ritiene che anche le persone con sintomi iniziali (febbre, dolori muscolari, stanchezza, ecc.) possano trasmettere l'infezione.

PREVENZIONE

- E' importante evitare il contatto stretto con persone con sintomi (febbre, rigonfiamento dei linfonodi, lesioni cutanee in particolare vescicole o croste), fino alla caduta delle croste.
- In particolare, è importante evitare il contatto, anche sessuale, con persone con un'eruzione cutanea, soprattutto se localizzata a livello inguinale, genitale e/o con ulcere orali.
- L'utilizzo del preservativo previene dalle Infezioni a Trasmissione Sessuale ma non dalla diffusione del virus del vaiolo delle scimmie: infatti, durante i rapporti sessuali, è col contatto pelle-pelle o con lesioni genitali o delle mucose che il virus può essere trasmesso. Non vi sono ad oggi evidenze di trasmissione attraverso il liquido seminale o le secrezioni vaginali.
- Le persone con infezione accertata devono osservare un periodo di isolamento fino alla completa guarigione (caduta delle croste).



Se hai dubbi o pensi di esserti esposto/a ad un rischio per l'infezione da MPX o per altra Infezione a Trasmissione Sessuale, rivolgiti ad un Centro per le Infezioni Sessualmente Trasmesse per una corretta valutazione.

DOVE: UOC MTS di Milano, Viale Jenner, 44 - Milano

QUANDO: il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 15.30

COME: l'accesso avviene senza prescrizione medica. I test, la visita medica specialistica, la terapia sono gratuiti.

Per informazioni e appuntamenti:

- telefono 02 85789871 dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì
- mail: mtsmi@ats-milano.it o appuntamentimts@ats-milano.it

Oppure rivolgiti presso il centro di Malattie Infettive di riferimento.